

# Utilização da ortodontia interceptativa para correção da mordida cruzada

*Apresentadora: Thaysa Neivas Camargo*

*Autores: Gustavo Guterres Teixeira, Ohana Rodrigues Silva*

*Orientadores: Carla Cristina Neves Barbosa, Sileno Correa Brum*

## Resumo

A mordida cruzada posterior caracteriza-se por uma relação transversal inadequada dos dentes póstero-superiores em relação aos inferiores. Tem sido relatada como sendo uma das mais prevalentes más-oclusões em crianças na dentição decídua e mista, ficando atrás apenas da mordida aberta anterior, essa patologia deve ser corrigido o mais breve possível após o diagnóstico. A mordida aberta anterior é definida como a presença de um trespassse vertical negativo existente entre as bordas incisais dos dentes ântero-superiores e inferiores e tem como preponderante fator causal os hábitos de sucção e interposição lingual, podendo ser bem solucionada por meio de aparelhagem simples (interceptativa) em fase precoce, impedindo que assim, se torne um caso complexo e possivelmente cirúrgico na fase adulta. Este artigo tem como objetivo salientar a importância do tratamento interdisciplinar, relatando o caso de uma paciente com hábitos bucais que resultaram em uma mordida cruzada posterior e aberta anterior. O tratamento foi realizado com o uso do aparelho da técnica de Maurício Vaz de Lima (Placa de Hawley, expansor e grade reeducadora) associado à terapia fonoaudiológica, comprovando assim a necessidade e importância de tratamento multidisciplinar para obtenção de resultados satisfatórios.

**Palavras-Chave:** Odontologia. Ortodontia Interceptativa. Mordida Cruzada.